

# Presencia Bioquímica

Medio de difusión de la Asociación  
de Bioquímicos de Córdoba

Diciembre 2025 #343



Felices  
Fiestas!

## Trabajo científico

Prevalencia y perfil de sensibilidad antimicrobiana de microorganismos aislados en infecciones urinarias de adultos de la comunidad de la Ciudad de Córdoba, Argentina



9 de Julio 1085 - Córdoba - CP 5.000

[www.bioquimicoscba.com.ar](http://www.bioquimicoscba.com.ar) - Tel. 0351 4245330 - 4232153



Buscanos en Facebook



**Nuestra nueva planta elaboradora.  
1300 metros cuadrados, para seguir  
producido productos de calidad  
y eficiencia.**



# 66 AÑOS DE VIDA, TRABAJO Y FUTURO

Dra. Videla Isabel



El 13 de diciembre pasado se cumplieron 66 años de que un grupo de colegas inquietos y con visión de futuro, en 1959, dieron a luz la Primera Entidad Bioquímica en la provincia: la Asociación de Bioquímicos de Córdoba, haciendo historia.

Así se inició una vida institucional profesional que, a lo largo de estos primeros 66 años de vida, transitó caminos, a veces finamente transitables, otras de vías difíciles... más siempre se han recorrido con el entusiasmo que proponen principios firmes de trabajo serio y profesional. Siguiendo el modelo de los fundadores, trabajamos con pasión, enfocados en la evolución científica profesional, y poder lograr los mejores resultados para nuestros asociados y a la vez ser útiles a la sociedad entera.

Los filósofos de la Antigua Grecia distingúan la existencia verdadera de la apariencia sensible y cambiante. Heráclito planteaba el no haber esencias, el no existir de las cosas, considerando que verdaderamente existe el movimiento, el cambio o el devenir.

Así, a lo largo de estos 66 años, hemos visto cómo la bioquímica evolucionó y se convirtió en una disciplina fundamental en el equipo de salud, donde nuestra responsable actividad da certeza a más del 70 % de los diagnósticos médicos. Agradecemos a todos los que han

contribuido a la permanencia de la querida ABC, con aciertos y con errores, pero con la conciencia tranquila de haber respetado y hacer respetar valores y principios profesionales, éticos y morales.

Invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de un futuro que se avecina pleno de novedades.

La Bioquímica es la base de la vida y nosotros somos los protectores de ese futuro.

Brindemos por un 2026 con oportunidades para seguir creciendo juntos.

Felicidades!

## SUMARIO

Editorial.....	1
Sumario.....	2
Novedades.....	3
SEPARATA	
PREVALENCIA Y PERFIL DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE MICROORGANISMOS AISLADOS EN INFECCIONES URINARIAS DE ADULTOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA .....	4

Asociación de Bioquímicos de Córdoba

Personería Jurídica N°344 "A"  
Decreto N° 9647

Presencia Bioquímica es un medio de difusión propiedad de la Asociación de Bioquímicos de Córdoba

## "AVANCE Y CAMBIO BIOQUÍMICO" AUTORIDADES PERÍODO 2025-2028

### Comisión Directiva

PRESIDENTE:	Dra. VIDELA, D. Isabel M.P.: 1289
SECRETARIA:	Dra. ARGUELLO, Elizabeth M. C. M.P.:289
TESORERO:	Dra. ALVAREZ, Susana V. M.P.: 2983
VOCAL TITULAR 1º:	Dr. VARELA, Claudio M.P.: 5060
VOCAL TITULAR 2º:	Dr. BARALE, Edgar R. M.P.: 4036
VOCAL SUPLENTE 1º:	MARZANO, Gabriela N. M.P.:1708
VOCAL SUPLENTE 2º:	MARUCCO, Mercedes M.P.: 2396

### Tribunal de Honor

Miembros Titulares:	Dr. MARTÍNEZ, Juan E. M.P.: 3095 Dra. NAHRA, Marta M.P.: 612 Dr. OVEJERO, Gustavo A. M.P.: 2923
Miembros Suplentes:	Dra. CARMONA, Alicia B. M.P.2164 Dr. GONZÁLEZ, Luis E. M.P.: 2032 Dra. YUDOWSKI, Silvia M.P.: 1900

### Comisión Revisora de Cuentas

Miembros Titulares:	Dr. ZARAZAGA, Gustavo M.P.: 2866 Dra. BRITOS, Fabiana C. M.P.: 2844 Dr. BARRERA, Aldo Luis M.P.: 2800
Miembros Suplentes:	Dr. POLACOV, Carlos. M.P.: 2816 Dra. RUIS de LOBBIA Ana M. M.P.: 1035

Director general  
Dra. Videla Dora Isabel

Director ejecutivo  
Dr. Gustavo Ovejero

Director administrativo  
Dra. Susana Alvarez

Comité científico  
Dra. Balseiro María Isabel †  
Dr. Bocco José Luis  
Dra. Massa María Angélica  
Dr. Moretti Edgardo  
Dra. Romero Marta  
Dra. Salgado Susana  
Dr. Gennero Daniel  
Dra. Basso Beatriz  
Dr. Juan Martínez

Redacción y administración  
9 de Julio 1085  
Tel. 0351 4232153  
CP 5000  
Córdoba  
e-mail: abioc@fibertel.com.ar


Presencia Bioquímica, es una publicación de distribución gratuita.  
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad del autor. El material publicado puede ser reproducido sin autorización, citando la fuente.  
Registro de propiedad intelectual  
Nº 14796738 IF-2020  
ISSN 0326-0070

# Novedades

## NUEVOS BENEFICIOS PARA SOCIOS



## SOCIOS DE ABC



Les recordamos que continúa vigente el servicio de débito automático de Tarjeta Naranja para los pagos mensuales de Cuota Social, Casa del Bioquímico, Seguro de Mala Praxis. Para compras en Proveeduría debe consultar por mail: proveeduriaabc@fibertel.com.ar o al Tel.: 4257077.

### NORMATIVA COBICO PARA PUBLICITAR

Según normativas del Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de Córdoba "TODA" publicidad de los colegiados debe contener los siguientes datos: Apellido y Nombre Profesión M.P Autorización del CoBiCo Número de Aprobación de la publicidad.

**RESPETEMOS  
LA NORMATIVA.**

## Prevalencia y perfil de sensibilidad antimicrobiana de microorganismos aislados en infecciones urinarias de adultos de la comunidad de la Ciudad de Córdoba, Argentina

Ribotta, María Eugenia<sup>1\*</sup>; Boggio, Elisa<sup>2</sup>; Ruiz, Susana Eugenia<sup>3</sup>; Carrizo, Silvia Guadalupe<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Laboratorio Central, Hospital de Pronta Atención “Madre Teresa de Calcuta”. Córdoba, Córdoba, Argentina.

<sup>2</sup>Laboratorio Central, Departamento de Bacteriología Clínica, Clínica y Maternidad del Sol. Córdoba, Córdoba, Argentina.

<sup>3</sup>Laboratorio Central, Área de Microbiología, Laboratorio LACE S.A.. Córdoba, Córdoba, Argentina.

<sup>4</sup>Laboratorio Central, División Microbiología, Hospital Rawson. Córdoba, Córdoba, Argentina.

\*Contacto: Ribotta, María Eugenia; Hospital de Pronta Atención “Madre Teresa de Calcuta”. Córdoba, Córdoba (X5000), Argentina; [eugeribotta@hotmail.es](mailto:eugeribotta@hotmail.es)

### Resumen

**Introducción:** Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las patologías más frecuentes. Su incidencia varía según la edad y el sexo. Evaluar la prevalencia de los uropatógenos y el perfil de sensibilidad antibiótica es fundamental para un correcto manejo del cuadro estableciendo tratamientos precoces que reduzcan la gravedad, morbilidad y selección de resistencia. **Objetivos:** Describir la prevalencia, resistencias antibióticas y mecanismos de resistencia de los agentes de ITU en la comunidad. **Materiales y métodos:** Se analizaron 6824 urocultivos desde el 1º de abril al 30 de septiembre del 2022 en pacientes con sospecha de ITU de la comunidad, en el Laboratorio LACE S.A., Córdoba, Argentina. Se evaluó la etiología global y la distribución de uropatógenos por edad y sexo. **Resultados:** Se reportó 24,0% de urocultivos positivos. La edad media de la población fue de 58 años (DE=19,83). La ITU tuvo mayor prevalencia en mujeres y aumentó con la edad. *Escherichia coli* fue el microorganismo principalmente aislado, que representó el 72,6% del total y mantuvo dicha prevalencia en todos los grupos etarios y en ambos sexos. Los porcentajes de resistencia de los principales antimicrobianos para *Enterobacteriales* fueron los siguientes: ampicilina: 64,9%, ciprofloxacina: 42,3%, ampicilina/sulbactam: 39,9% y trimetoprima/sulfametoaxazol (TMS): 36,2%. Además, en este grupo de microorganismos, 12,6% produjo betalactamasas de espectro extendido y 1,1% carbapenemasas. **Conclusión:** *Escherichia coli* fue el microorganismo principalmente aislado en este entorno, con tasas de resistencia superiores al 20% para ampicilina, ciprofloxacina y TMS. Por lo tanto, según recomendaciones del Consenso Argentino de Intersociedades de Infecciones Urinarias, estos antibióticos no deberían utilizarse empíricamente. Este trabajo destaca la importancia de orientar el tratamiento empírico considerando edad y perfil de resistencia local, además de realizar estudios periódicos de vigilancia.

**Palabras clave:** infección del tracto urinario, prevalencia, resistencia antibiótica, mecanismos de resistencia, tratamiento empírico.

## Introducción

Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan un desafío clínico en la práctica médica actual y son la segunda causa de consulta primaria. Su incidencia varía con el sexo y la edad. Afecta principalmente a mujeres de todas las edades, a excepción de los primeros 3 meses de vida, período en el cual predomina en varones<sup>1-4</sup>. Los factores predisponentes en el sexo femenino se relacionan con una menor longitud uretral, las prácticas sexuales, alteraciones en la microbiota vaginal, factores hormonales, entre otros<sup>1,2,4-7</sup>.

Las ITU abarcan una amplia gama de presentaciones clínicas, tales como cistitis (síndrome que comprende disuria, polaquiuria, tenesmo, entre otros síntomas) o pielonefritis aguda (caracterizada por dolor y/o sensibilidad en la fosa renal y fiebre), entre otras afecciones, que pueden conducir a condiciones crónicas y potencialmente mortales, si no se tratan adecuadamente<sup>4,5</sup>.


La fisiopatología de las ITU involucra un proceso complejo donde las particularidades del uropatógeno interactúan con las características propias del huésped. La mayoría de estas infecciones se producen por vía ascendente como consecuencia de la colonización de la zona periuretral y uretral con microorganismos de origen intestinal. La microbiota fecal constituye un importante reservorio para uro\_patógenos, sobre todo *Escherichia coli* (*E. coli*). De acuerdo con estudios previos, más del 90% de las ITU son monomicrobianas<sup>8</sup>. La etiología es diversa, si bien *E. coli* es el principal microorganismo aislado en pacientes sin comorbilidades. Sin embargo, no se puede subestimar la importancia de otros patógenos, como *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Enterococcus* spp. y *Staphylococcus saprophyticus* (*S. saprophyticus*), que también pueden desempeñar un papel significativo. En cuanto a *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*), su rol etiológico está en aumento y ha sido asociada con ITU tanto comunitarias como nosocomiales, que presentan un desafío clínico adicional debido a su capacidad para desarrollar resistencia a múltiples antibióticos. Por otro lado,

*Proteus mirabilis* (*P. mirabilis*) exhibe una notable virulencia y capacidad para formar cálculos urinarios, lo que contribuye a la cronicidad y complicaciones de las ITU. Además, *Enterococcus* spp., generalmente asociado con infecciones intrahospitalarias, está en aumento como agente de ITU en el nivel comunitario. Finalmente, *S. saprophyticus*, aunque menos frecuente que otros agentes, es relevante especialmente en mujeres jóvenes sexualmente activas<sup>3-5</sup>.

En los últimos años, se ha producido un incremento de la resistencia a antimicrobianos, principalmente en bacilos Gram negativos. Esto ha generado preocupación debido a su impacto en la eficacia de los tratamientos médicos y la propagación de microorganismos resistentes. En las ITU, generalmente, la terapia antibiótica se instaura empíricamente, por lo que es necesario conocer la epidemiología y frecuencia de las resistencias locales. La Sociedad Argentina de Infectología (S.A.D.I.), en su "Consenso Argentino de Intersociedades de Infecciones Urinarias" recomienda el uso de nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina trometamol como tratamiento empírico de ITU baja no complicada, considerando que la tasa de resistencia de un antibiótico debe ser menor del 20% para utilizarse ante sospecha de esta afección<sup>4-6</sup>. Respecto de la trimetoprima/sulfametoazol (TMS) y la ciprofloxacina, los estudios regionales realizados en la provincia de Córdoba muestran tasas de resistencia variables, pero, en general, se encuentran en torno al 30%, por lo tanto, se desaconseja su uso de manera empírica<sup>2-4,6,8</sup>.


La variabilidad en la sensibilidad antibiótica se atribuye en gran medida a la adquisición de mecanismos de resistencia por parte de los microorganismos, tales como la expresión de las enzimas betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y carbapenemasas, que confieren resistencia a la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos provocando una disminución en la efectividad de los tratamientos con falla terapéutica. Por estos motivos, vigilar los mecanismos de resistencia circulantes en la comunidad aporta información en la toma de decisiones de la terapia empírica inicial<sup>8</sup>.

**Figura 1.** Microorganismos aislados de urocultivos positivos de adultos de la comunidad: distribución por grupos, en orden de frecuencia.



► Representación de microorganismos aislados de urocultivos positivos de adultos de la comunidad, distribuidos por grupos, en orden de menor a mayor frecuencia: *Corynebacterium* sp., bacilos no fermentadores de la glucosa (BNF), *Candida* sp., *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Enterococcus* sp. y Enterobacteriales.

**Figura 2.** Microorganismos aislados de urocultivos positivos de adultos de la comunidad: distribución por sexo, en orden de frecuencia.



► El siguiente gráfico representa la frecuencia de los principales microorganismos causantes de ITU en la comunidad, discriminados por sexo y ordenados de mayor a menor: *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, otros enterobacteriales, *Staphylococcus coagulasa negativa*, *S. saprophyticus*, *S. aureus*, *Streptococcus sp.*, *E. faecalis*, *Enterococcus faecium* (*E. faecium*), bacilos no fermentadores de la glucosa (BNF), *C. albicans*, *C. no albicans*, *Corynebacterium urealyticum* (*C. urealyticum*).

En este contexto, el objetivo de este trabajo es describir la prevalencia, resistencias antibióticas y mecanismos de resistencia de los microorganismos causales de ITU en pacientes ambulatorios que asistieron al laboratorio privado LACE S.A. de la provincia de Córdoba, Argentina.

## Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional de los resultados de los urocultivos de pacientes con diagnóstico de ITU que concurrieron al laboratorio privado LACE S.A. de la provincia de Córdoba, Argentina, desde el período comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre de 2022.

La población estudiada abarcó adultos de 18 a 99 años, de ambos sexos, con sospecha de ITU adquirida en la comunidad. Para profundizar en el análisis, se los dividió en tres grupos etarios: grupo 1 (18-40 años), grupo 2 (41-60 años) y grupo 3 (más de 61 años). Además, se realizó un estudio comparativo de la etiología de ITU entre ambos sexos, sin considerar la edad de los pacientes.

Se excluyeron individuos con tratamiento antibiótico previo, alteraciones estructurales y/o funcionales de las vías urinarias (vejiga neurogénica, litiasis urinaria, anomalías anatómicas de las vías urinarias, reflujo vesicoureteral), con cateterismo urinario permanente o intermitente, inmunosuprimidos, oncológicos y hospitalizados por más de 72 h.

Debido a que el estudio fue retrospectivo, la información recolectada se tomó de una base de datos randomizadas

sin requerir consentimiento informado de los pacientes.

Se analizaron los urocultivos positivos del período de tiempo antes mencionado, y aquellos que cumplían con los criterios de inclusión del estudio fueron tabulados en una hoja de cálculo [Microsoft Excel] para su posterior análisis.

Las muestras de orina se obtuvieron por micción espontánea con la técnica de chorro medio descripta por Lopardo, H.<sup>9</sup> y se procesaron dentro de las 2 horas de recolección o se conservaron a 4º C durante 24 horas. Aquellas con recuento de leucocitos de más de 5/campo de 400x en el examen microscópico del sedimento urinario se consideraron con respuesta inflamatoria positiva. Las coloraciones de Gram de las muestras en estudio no fueron realizadas.

Todas las muestras fueron sembradas con ansa calibrada de 5 µL en agar cromogénico (agar chromID® CPS, Biomerieux) e incubadas en aerobiosis a 35ºC durante 24 h. Aquellas que presentaron respuesta inflamatoria, pero sin desarrollo en el cultivo inicial, fueron resembradas en agar chocolate (agar chocolate + PolyVitex [PVX], Biomerieux) e incubadas en microaerofilia a 35ºC durante 48 h con la finalidad de investigar microorganismos fastidiosos.

La identificación bacteriana y la sensibilidad antibiótica fueron realizadas por el método automatizado VITEK®2 Compact (VITEK®2 Compact, Biomerieux). La interpretación de los perfiles de sensibilidad se basó en los puntos de cortes establecidos por el Clinical and Laboratory Standards Institute<sup>10</sup>.

Con las variables numéricas, se calcularon parámetros

estadísticos, tales como media, desviación estándar y mediana, mientras que, para variables categóricas, se obtuvieron las frecuencias porcentuales.

Para el procesamiento de datos, se empleó un software de análisis estadístico, InfoStat® [InfoStat®, versión 2020]. La prueba de Chi-cuadrado se utilizó para comprobar la significancia estadística de las frecuencias obtenidas, y se asumió un valor de  $p<0,05$ .

## Resultados

Durante el período en estudio, se procesaron 6824 urocultivos de pacientes de la comunidad con sospecha clínica de ITU. Del total de casos estudiados, se aislaron 1639 uropatógenos con desarrollo monomicobiano, y se determinó un porcentaje de positividad del 24,0%. En 581 casos, se obtuvo desarrollo polimicrobiano [aislamientos con más de 3 microorganismos], lo cual representó un 8,5% de muestras contaminadas por errores en la recolección. En 4604 (67,5%), no hubo desarrollo de microorganismos. De estos últimos, 4449 (65,2%) no presentaron respuesta inflamatoria y 155 (2,3%) fueron negativos con respuesta inflamatoria.

El 81,1% de los urocultivos positivos ( $n=1329$ ) correspondieron a mujeres, y el 18,9% ( $n=310$ ), a varones. La edad media de la población estudiada fue de 58 años ( $DE=19,83$ ). Al discriminar por sexo, la edad media en varones fue de 66 años ( $DE=15,83$ ) y de 56 años ( $DE=20,19$ ) en mujeres.

La frecuencia de los grupos de microorganismos aislados mostró que el 86,0% correspondió a *Enterobacteriales*, seguido por *Enterococcus* spp. con un 5,0% y *Staphylococcus* spp. con un 4,0%. La etiología de la ITU en la población estudiada puede observarse en la Figura 1.

En el análisis de la distribución de uropatógenos por sexo, *E. coli* fue el microorganismo aislado con mayor frecuencia, tanto en mujeres como en hombres, seguido de *K. pneumoniae* y *Enterococcus faecalis* [*E. faecalis*], dato que resultó estadísticamente significativo ( $p<0,05$ ). Es posible apreciar que el desarrollo de *P. mirabilis*, *K. pneumoniae* y *E. faecalis* fue mayor en varones que mujeres.

La prevalencia porcentual de los agentes etiológicos distribuidos por sexo se visualiza en la Figura 2.


En cuanto a la tasa de positividad de los urocultivos por grupo etario, el grupo 3, de más de 61 años (51,9%;  $n=850$ ), obtuvo la mayor tasa respecto del resto de los rangos etarios (18 a 40 años: 22,9%,  $n=376$ ; 41 a 60 años: 25,2%,  $n=413$ ).

En la Tabla I, se representan los diferentes agentes etiológicos hallados por grupo etario.

Respecto de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana en los enterobacteriales, se obtuvieron los siguientes porcentajes de resistencia [R; (n)]: ampicilina, 64,9% (912); ciprofloxacina, 42,3% (509); ampicilina/sulbactam, 39,9% (563); TMS, 36,2% (509); cefalosporinas de 1º generación, 19,2% (271); cefalosporinas de 3º generación, 15,2% (214); cefepime, 13,4% (188); gentamicina, 12,9% (182); nitrofurantoína, 12,5% (175); piperacilina/tazobactam, 7,8% (110); amikacina, 3,0% (42); carbapenemes, 1,1%<sup>15</sup>. En la Figura 3, se presentan los mecanismos de resistencia detectados en orden de frecuencia.

En las bacterias Gram positivas, *E. faecalis* ( $n=86$ ) presentó un porcentaje de R (n) de 28,1% (24) a ciprofloxacina y mostró fenotipo salvaje para el resto de los antibióticos (ampicilina y nitrofurantoína); en cuanto a *Staphylococcus* spp. ( $n=67$ ), el porcentaje de R (n) fue: gentamicina, 17,9% (12); ciprofloxacina, 17,9% (12) y menor del 10% para ni-

**Figura 3.** Mecanismos de resistencia del total de enterobacteriales aislados de urocultivos positivos de adultos de la comunidad, en orden de frecuencia.



► Se representa la frecuencia de mecanismos de resistencia hallados en enterobacteriales, provenientes de muestras de orina de pacientes adultos de la comunidad. (*Betalactamasa de espectro ampliado* [BLEA], sin mecanismo de resistencia, betalactamasa de espectro extendido [BLEE], *betalactamasa tipo AmpC*, *carbapenemasa tipo metalobetalactamasa* [MBL] y *carbapenemasa tipo KPC*).

**Tabla I.** Distribución de microorganismos aislados en urocultivos de pacientes con ITU de la comunidad, según los distintos grupos etarios.

Microorganismo (n= 1639)	Grupo etario (años)		
	18-40 (n=376)	41-60 (n=413)	Más de 61 (n=850)
<i>E. coli</i> (n= 1195)	16,7%	19,4%	36,9%
<i>K. pneumoniae</i> (n=117)	0,7%	2,0%	4,4%
<i>E. faecalis</i> (n=84)	1,3%	1,0%	2,7%
<i>P. mirabilis</i> (n=52)	0,6%	0,7%	1,9%
<i>S. agalactiae</i> (n=46)	1,2%	0,5%	1,1%
<i>S. aureus</i> (n= 26)	0,5%	0,5%	0,6%
coagulasa negativos (n=22)	0,3%	0,3%	0,7%
<i>S. saprophyticus</i> (n=19)	1,0%	0,1%	0,1%
<i>C. koseri</i> (n=12)	0,1%	0,3%	0,4%
<i>C. no albicans</i> (n=12)	0,1%	0,1%	0,6%
<i>E. cloacae</i> (n=9)	0,0%	0,1%	0,5%
<i>P. aeruginosa</i> (n=9)	0,1%	0,1%	0,4%
<i>C. albicans</i> (n=?)	0,1%	0,0%	0,4%
<i>K. aerogenes</i> (n=6)	0,1%	0,1%	0,2%
<i>M. morganii</i> (n=6)	0,0%	0,1%	0,2%
<i>K. oxytoca</i> (n=5)	0,1%	0,0%	0,2%
<i>A. baumannii</i> (n=4)	0,1%	0,0%	0,1%
<i>C. freundii</i> (n=3)	0,0%	0,0%	0,2%
<i>S. grupo viridans</i> (n=3)	0,1%	0,0%	0,1%
<i>C. urealyticum</i> (n=2)	0,0%	0,1%	0,1%
<i>E. faecium</i> (n=2)	0,0%	0,0%	0,1%

► Se representa la frecuencia de los microorganismos aislados en urocultivos de pacientes con ITU de la comunidad, en los distintos grupos etarios establecidos en el estudio realizado en el Laboratorio LACE S.A. de la provincia de Córdoba.

trofuranotína (1) y TMS (6). Respecto de la meticilino resistencia de *Staphylococcus* spp., la misma fue evaluada a través de cefoxitina (FOX), y resultó el porcentaje de R (n) de 16,4% [11].

## Discusión

Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan una causa significativa de morbilidad en pacientes de la comunidad. En este estudio, el 24,0% de los urocultivos resultaron positivos, cifra menor que la de los porcentajes reportados en otros trabajos<sup>1,2</sup>. Esto puede atribuirse a factores como variabilidad geográfica, condiciones socioeconómicas, entornos ambientales, entre otros aspectos que aportan a la incidencia y gravedad de las ITU.

Las ITU pueden ser causadas por diversos agentes, como virus, parásitos, hongos y bacterias, siendo estas últimas las más frecuentes, por lo que se enfocó este estudio en investigar su prevalencia. Debido a que la etiología puede variar según el

grupo demográfico estudiado, se llevó a cabo un análisis detallado de las tasas de incidencia por especie bacteriana agrupando a los pacientes según grupos de edad y sexo.

En el análisis de la distribución por sexo, se observó que 81,1% de las ITU ocurrió en mujeres. Este hallazgo se alinea con la bibliografía respaldando la evidencia de que las ITU afectan principalmente a las personas del sexo femenino. Esto posiblemente se debe a factores anatómicos y hormonales<sup>1,4,6</sup>, lo que ha sido documentado en estudios previos<sup>1,2,8,11</sup>. Asimismo, se destaca que *E. coli* fue el microorganismo más frecuentemente aislado en todos los segmentos poblacionales analizados, lo cual concuerda con la literatura existente<sup>1,3,8</sup>.

Al evaluar la frecuencia de *Enterobacteriales*, es posible identificar que, en el sexo masculino, *E. coli* representó el 47,7%, seguido por *K. pneumoniae* (11,6%) y *P. mirabilis* (6,8%). En el sexo femenino, *E. coli* representó el 78,8%; el resto de bacilos Gram negativos tuvo menor frecuencia, de

forma similar a lo reportado<sup>8</sup>.

En relación con los cocos Gram positivos, *E. faecalis* resultó el tercer agente de ITU más frecuente en ambos grupos representando el 10,3% en hombres y 3,8% en mujeres. Sin embargo, al examinar otros microorganismos, se observó que, para el sexo masculino, hubo un porcentaje mayor de *Staphylococcus* spp. (7,1%) respecto de las mujeres (3,4%). Existen pocas investigaciones que indaguen por qué los varones tienden a ser infectados en mayor proporción por microorganismos distintos de *E. coli*, por lo tanto, sería útil realizar un análisis centrado en este grupo para comprender mejor las causas. Por ende, los datos que arroja este estudio sobre la distribución por sexo de los microorganismos causales de ITU aportan valor para el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento que se adecuen a las poblaciones específicas afectadas por esta infección.

Al analizar los datos por grupos etarios, se observa que la mitad de la población estudiada corresponde a personas mayores de 61 años (51,9%). Esta tendencia se refleja en la distribución de microorganismos, con una frecuencia elevada de *E. coli*, *K. pneumoniae* y *E. faecalis*. Se decidió considerar el estudio de Martos y col., que se enfoca en una población similar, ubicada en la misma área geográfica, y que emplea las mismas técnicas de análisis, como estudio de referencia para comparar nuestros resultados. Es importante destacar que, a diferencia de este estudio<sup>8</sup>, no se identificó a *S. saprophyticus* como una de las principales causas de ITU. Esto sugiere que la composición del grupo etario puede influir en la frecuencia de los microorganismos hallados. Además, es crucial considerar las posibles variaciones debido al período de tiempo analizado; mientras que este estudio abarcó un período de seis meses, el de Martos y col.<sup>8</sup> recopiló datos durante un período de dos años. Estas diferencias temporales pueden afectar las comparaciones entre ambos por lo que sería valioso extender el tiempo de recolección de datos.

En referencia a la susceptibilidad antimicrobiana, según el “Consenso Argentino de Intersociedades de Infecciones Urinarias”<sup>6</sup>, se indica nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina trometamol como opciones de tratamiento para ITU no complicada de la comunidad en ambos sexos. En este estudio, se obtuvo un porcentaje de resistencia del 12,5% a nitrofurantoína y del 19,2% a cefalosporinas de primera generación. En esta ocasión, no se evaluó fosfomicina trometamol. Se puede inferir que estos antibióticos pueden utilizarse como tratamiento empírico, ya que su porcentaje de resistencia es menor del 20,0%. Por el contrario, no sería recomendable administrar ampicilina, TMS, ciprofloxacina empíricamente, ya que exceden lo establecido<sup>6</sup>.

Finalmente, al examinar los mecanismos de resistencia identificados para el grupo de enterobacteriales, se observó que predominaron las betalactamasas de espectro ampliado (BLEA 51,4%), tanto adquiridas como naturales, seguidas por betalactamasas de espectro extendido (BLEE, 12,6%). Por esta razón, el tratamiento empírico con ampici-

lina está desaconsejado, y sería recomendable evitar el uso de cefalosporinas para minimizar la selección de BLEE. En otros estudios<sup>8</sup>, se encontró menor frecuencia de microorganismos con expresión de BLEE, lo que indica un incremento en estos casos entre los pacientes de la comunidad. Consecuentemente, es crucial tomar medidas preventivas para abordar esta problemática. Por su parte, aunque imipenem y meropenem arrojaron resultados aceptables, además de su alto costo y de su administración parenteral, su uso rutinario es desaconsejado debido al riesgo de seleccionar carbapenemasas.

En síntesis, en este estudio se obtuvo una prevalencia de ITU del 24,0%, de una población de adultos de la comunidad que asistieron al Laboratorio LACE S.A., lo cual se encuentra en línea con la literatura<sup>1,2</sup>. Una característica distintiva es el envejecimiento poblacional en comparación con otros informes<sup>8</sup>. Se demuestra la mayor prevalencia en mujeres (81,1%), coherente con estudios previos<sup>2,3,8</sup>. Las disparidades de prevalencia entre géneros revelan una proporción más elevada de otros enterobacteriales y enterococos en hombres. En concordancia con la bibliografía<sup>6</sup>, se concluye que es clave la prudencia en la prescripción empírica de ciprofloxacina, ampicilina, ampicilina/sulbactam y TMS debido a su resistencia, menor del 20,0%. Asimismo, los mecanismos de resistencia, encabezados por BLEA seguidas de BLEE, resaltan la necesidad de estrategias preventivas. Estas medidas podrían incluir promoción de políticas de uso racional de antibióticos, fomento de vigilancia microbiológica continua y desarrollo de programas de concientización dirigidos al personal de salud y población general. Abordar estos desafíos de manera proactiva contribuirá a optimizar los tratamientos antimicrobianos y reducir el impacto individual y comunitario de ITU.

### Agradecimientos

Al Servicio de Bacteriología del Laboratorio LACE S.A. y sus integrantes, por brindarnos la posibilidad de realizar este trabajo ofreciéndonos los datos para analizar.

A nuestra colega, Virginia Pilar Fernández, por su aporte y colaboración en el análisis estadístico de los datos.

A nuestra colega y becaria de CONICET, Clara Nicole Castañares, por sus aportes, colaboración y dedicación en la redacción del trabajo.

### Conflictos de intereses

Los autores declaran no poseer conflicto de intereses.

### Referencias bibliográficas

1. Chiavassa L, Vaschalde G. Prevalencia y sensibilidad antibiótica de microorganismos causantes de infecciones del tracto urinario. 2015. [Internet]. [Consultado agosto 2024]. Disponible en: <https://www.cobico.com.ar/wp-content/archivos/2017/03/PREVALENCIA-Y-SENSIBILIDAD-ANTIBIOTICA-DE-MICROORGANISMOS-CAUSANTES-DE-INFECIONES-DEL-TRACTO-URINARIO.pdf>
2. Morales-Espinosa R, Montalvo MR, Galarza-Ruiz E, Madrigal de León HG, Ponce-Rosas ER, González-Pedraza Avilés A. Características clí-

- nicas y microbiológicas de la infección de vías urinarias bajas en población ambulatoria. Rev. Cuba. Med. Gen. Integr. 2023; 39. [Internet]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v39n1/1561-3038-mgi-39-01-e2229.pdf>
3. Sainz PL, Berrueto F. Etiología y perfiles de sensibilidad en infecciones urinarias pediátricas de la comunidad. Presencia Bioquímica. 2011;5:10.
4. Prieto L, Esteban M, Salinas J, Adot JM, Arlandis S, Peri L, et al. Documento de consenso de la Asociación Española de Urología en el manejo de las infecciones del tracto urinario recurrentes no complicadas. Actas Urol Esp. julio de 2015;39(6):339-48, <https://doi.org/10.1016/j.acuro.2014.10.003>
5. Mandell, Douglas y Bennett. Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica. 8.<sup>a</sup> ed. Vol. 1. Elsevier; 919-946.
6. Nemirovsky C, López-Furst MJ, Pryluka D, De Vedia L, Scapellato P, Colque A, et al. Consenso Argentino Intersociedades de Infección Urinaria 2018-2019 - Parte I. Medicina (Bs. As.). 2020;80(3):229-240, <https://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v80n3/v80n3a06.pdf>
7. Rodríguez BC, Jazmin A, Tapia BT, Sofía K. Relación entre estilos de vida e infección recurrente del tracto urinario bajo en mujeres del puesto de salud Villa Hermosa 2023. [Internet]. 2023. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/10794>
8. Martos I, Camusso GC, Albornoz M, Nores JB, Juaneda R, Belisle DF. Perfil etiológico y sensibilidad antimicrobiana en 1740 infecciones urinarias de la comunidad en la ciudad de Córdoba, Argentina. Arch Esp Urol. 2021;74 (?):645-681. PMID: 34472432
9. Lopardo H, Bantar, C. Urocultivo. Procesamiento, Criterios de Interpretación e Informe. Apuntes de Laboratorios Volumen III. Laboratorios Britania; 2013. [Internet]. [Consultado julio 2024]. Disponible en: [https://www.britaniablab.com/capacitacion/capacitacion/7/volumen\\_3\\_urocultivo](https://www.britaniablab.com/capacitacion/capacitacion/7/volumen_3_urocultivo)
10. Li JS, Weinstein MP, Bobenikh AM, Campeau S, Cullen SK, Galas MF, et al. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 2022;32.
11. Foxman B. Urinary Tract Infection Syndromes: occurrence, recurrence, bacteriology, risk factors and disease burden. Infect Dis Clin North Am. 2014;28(1):1-13, <https://doi.org/10.1016/j.idc.2013.09.003>

Fuente: ByPC ene-abr 2026; 90(1):11-17 // ISSN-e 2684-0359

**Experiencia en la calidad...**

**MS**

---

**LABORATORIO**  
**MASSA - SILEONI**

INDEPENDENCIA 644 PB - Tel (0351) 4212928/ 4250141  
CORDOBA X5000- Mail: [labmassasileoni@fibertel.com.ar](mailto:labmassasileoni@fibertel.com.ar)

**Instalaciones con 1821mt<sup>2</sup> dispuestos para investigación, docencia y atención al paciente**



**15 boxes de extracción y 2 amplias salas de espera**



**Laboratorio dedicados a 13 especialidades bioquímicas y médicas equipados con tecnología de punta**



**Promoción y subsidio de investigación biomédica especializada en el campo de la oncología**

**fpm**

fundación  
para el progreso  
de la medicina



**Ciclos de conferencias y convenios de colaboración científica con instituciones públicas y privadas**



+20 años de experiencia



**BIOCON** S.A.  
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



CENTRO DE ATENCIÓN ONLINE  
EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES



3512430482

| CASA CENTRAL CÓRDOBA  
**SAN JOSÉ DE CALASANZ 258**



3513080115

| CASA CENTRAL JESÚS MARÍA (CBA)  
**SARMIENTO 152**





# Compromiso con la excelencia

Nuestro Centro de Provisión y Gestionado posee la más completa línea de insumos y equipos que exige el profesional bioquímico. Precios inmejorables. Garantía de compra. Entrega a domicilio. Planes de pago con financiación directa, bancaria o a través de tarjetas de crédito. Atención personalizada.



**PROVEEDURÍA ABC**

Coronel Olmedo 154  
5000 Córdoba - Argentina



PEDIDOS: 0351-4257077

proveeduriaabc@fibertel.com.ar



**BIOCON** S.A.  
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  
[www.biocon.com.ar](http://www.biocon.com.ar)

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

 Abbott  
línea Alinity

Potencia tu laboratorio con Biocon:  
calidad, rapidez y precisión trabajando juntos para sus pacientes.

-  3513080115 CASA CENTRAL JESÚS MARÍA CÓRDOBA
-  3512430482 CASA CENTRAL CÓRDOBA

[bioconconsultas@gmail.com](mailto:bioconconsultas@gmail.com)

Importantes DESCUENTOS en material de vidrio chino.  
Consúltenos precio por unidad y cantidad.

Somos representantes  
**BIOPUR.**  
Consulte precios!



Presentamos  
nuestra línea propia  
de portaobjetos  
y cubreobjetos.



Catamarca 279 - Bº Centro  
(0351) 4242067 | [laboratorio@puraquimica.com.ar](mailto:laboratorio@puraquimica.com.ar)  
[www.puraquimica.com.ar](http://www.puraquimica.com.ar)

**PURA**  
**QUÍMICA**  
del Grupo Todo Droga




# Laboratorios Gornitz S.A.

**Desde 1948.  
Una historia de servicio,  
un futuro comprometido  
con su historia.**



Catamarca 1328  
Villa María - Córdoba  
0800 888 5959  
[laboratorios@gornitz.com](mailto:laboratorios@gornitz.com)  
[www.gornitz.com](http://www.gornitz.com)

**Pagá, transferí  
y consultá  
desde tu celular**



Descargá nuestra App



BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT N° 30-50001107-2. RECONQUISTA 151 CABA.